

## **Einteilung psychischer Störungen im höheren Lebensalter**

### **1. Altersabhängige behandlungsbedürftige psychische Störungen, die im Alter erstmals auftreten oder bis in Alter wirken, finden sich bei insgesamt ca. 30 % der über 65-jährigen.**

- ▶▶ **Demenzerkrankungen (ca. 10 %)**
  - ▶ Primäre Erkrankung des Gehirnes (am häufigsten: Demenz vom Alzheimerstyp)
  - ▶ Störungen der Hirndurchblutung (z.B. Multi-Infarkt-Demenz)
  - ▶ Demenz vom Mischtyp
  - ▶ Sekundäre Demenzen (Bis ca. 10% aller Demenzerkrankungen)  
Diese sind ursächlich behandelbar und teilweise rückbildungsfähig (z.B. bei Schilddrüsenunterfunktion, Vit. B12-Mangel )
  
- ▶▶ **Affektive Störungen (ca. 10 %)**

(z.B. Depressionen, Ängste, Anpassungsstörungen, Belastungen nach Trauma (oft noch nach vielen Jahren), Zwänge)
  
- ▶▶ **Verschiedene Störungen (ca. 10 %)**

(wahnhafte Syndrome, Suchterkrankungen, Psychosomatische Störungen, Persönlichkeitsstörungen)

### **2. Psychische Störungen in Verbindung mit anderen häufigen neuro-psychiatrischen Störungen (Komorbidität):**

- ▶▶ Parkinson + Demenz + Depression
- ▶▶ Schlaganfall + Depression + Demenz
- ▶▶ Chronische Schmerzsyndrome + Depression

### **3. Psychische Störungen bei älter werdenden Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen (körperlich-psychisch-neurologisch)**

- ▶▶ Geistige Behinderung + Demenz + Depression + Wesensänderung + Störung der Impulskontrolle (z.B. Down Syndrom + Alzheimer)
- ▶▶ Epilepsie + Wesensänderung + Psychose + Demenz
- ▶▶ Suchterkrankungen + Wesensänderung + Demenz + Depression
- ▶▶ Chronische Schizophrenie + EPS
- ▶▶ Chronifizierte Depression + Demenzrisiko
- ▶▶ Sekundäre geistige Behinderungen (z.B. nach Trauma, Operation) + Wesensänderung + Störung der Impulskontrolle + Demenz